



Versión: A-002 Fecha de Actualización: 20-11-2020

FICHA TECNICA

FUNGICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Categoría toxicológica: III – Color Azul

Registro Nacional ICA No. 2537

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tricyclazol	500 g/Kg
5-metil-1,2,4-triazolo-(3,4-b)(1,3)benzotiazole. de formulación a 20° C.	
Triadimefon	200 g/Kg
(RS)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one. de formulación	
Ingredientes Aditivos e Inertes:	c.s.p. 1 Kg

GENERALIDADES

ELEGIDO 700 WG Producto con acción preventiva, curativa y sistémica, que inhibe la síntesis del ergosterol en los hongos patógenos. El producto es fácilmente absorbido por raíces y hojas de la planta y se transloca hacia tejidos nuevos, protegiendo las nuevas estructuras del ataque de los patógenos.

Triciclazol:

Es un fungicida sistémico, absorbido rápidamente por las raíces y hojas y transportado hacia el extremo de las hojas a través del xilema, actúa reduciendo la formación de hifas de penetración a partir de aporosios del hongo y limita el crecimiento del micelio dentro de los tejidos de la planta. Es un fungicida triazol con acción preventiva, curativa y sistémica, que inhibe la síntesis del ergosterol en los hongos patógenos.

Triadimefon:

Es un fungicida sistémico de acción preventiva y erradicante. Se destaca por su buen control en general y además actúa en fase gaseosa y presenta un buen efecto residual, perteneciente al grupo de los Triazoles, que inhibe la biosíntesis del ergosterol en los

hongos patógenos, se absorbe por raíces y hojas y se trasloca fácilmente a tejidos jóvenes en crecimiento, con menor movimiento en tejido adulto y/o leñoso.

Manejo de Resistencia: Se recomienda utilizar ELEGIDO 700 WG en programa de manejo integrado del cultivo. Los ingredientes activos Tricyclazol y Triadimefon poseen moderado y bajo respectivamente de acuerdo con la clasificación FRAC, y adicionalmente la mezcla de estos dos compuestos con diferente mecanismo de acción hace que ELEGIDO 700 WG posea bajo riesgo de generar resistencia.

Clasificación FRAC:

Tricyclazol Código FRAC 2017: I-1

Triadimefon Código FRAC 2017: G-1

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/Ha	*P.R.	P.C
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Pyricularia (<i>Pyricularia Oryzae</i>)	0,5	4 horas	14 días
Rosas <i>Rosa sp</i>	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1,0		NA

* P.R.: Periodo de reentrada. P.C: Periodo de carencia

MOMENTO DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado de manera curativa, cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y de manera preventiva cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de los hongos, Se sugiere hacer rotaciones con productos de diferente mecanismo de acción para evitar la generación de resistencia.

PREPARACION DE LA MEZCLA DE APLICACIÓN: Llene el tanque de mezcla con ¼ del agua a utilizar, agregue la cantidad del producto agitando constantemente, posteriormente complete el volumen total con agua.

FITOCOMPATIBILIDAD: No presenta fitotoxicidad en cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en esta etiqueta, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad con variedades nuevas.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad cuando se realicen mezclas con otros plaguicidas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO
--

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**TELEFONO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS:
CISPROQUIM: 01-8000-916012 Fuera de Bogotá y 2886012 En Bogotá.**

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS"

Importado y Distribuido por
AGRIFARM COLOMBIA SAS
Teléfono 57 1 313 8312835
agrifarmcolombiasas@gmail.com
www.agrifarmcolombia.com

